

Geniřletilmiř zet

Eř Etkileřim Anketinin (Partner Interaction Questionnaire) Trke Geerlik ve Gvenirlik alıřması

Sosyal destek tipik olarak “kiřilerin mevcut olduėunu dřndkleri veya hem resmi destek grupları hem de resmi olmayan yardım iliřkileri baėlamında profesyonel olmayanlar tarafından kendilerine saėlanan sosyal kaynaklar” olarak tanımlanmaktadır. Bu baėlamda sigara baėımlıların sigara bırakmaya karar vermeleri, bunu denemeleri ve srdrmeleri konusunda aldıkları sosyal desteėin byk nemi vardır. Sigara baėımlarının vrelerinden aldıkları sosyal desteėin niteliėi ve řekli birbirlerinden ok farklı olsa da bu desteėin byk bir kısmının ekirdek aile yapısı iinden saėlandığı ařıkardır. Bu destek bazı hallerde olumlu olabileceėi gibi (geliřtirici, destekleyici davranıřlar v.b.) bazı hallerde de olumsuz olabilir (Eleřtirici, azaltıcı, gven azaltıcı davranıřlar v.b.). Sigara bırakma danıřmanlıėında sigara bırakmak isteyen kiřiye sosyal destek saėlanması vurgulanması nem arz etmektedir. Ancak eřler tarafından saėlanan sosyal desteėin niteliėini len niceliksel bir ara bulunmamaktadır. Bu alıřmanın amacı Cohen ve Lichtenstein (1990) tarafından geliřtirilmiř Eř Etkileřim Anketinin [Partner Interaction Questionnaire (PIQ-20)] Trke srmnn geerlik ve gvenirliėinin arařtırılmasıdır.

Eř etkileřim anketinin (PIQ) orijinal hali iki faktrldr. İlk faktr olumsuz ikinci faktr ise olumlu davranıřlarla ilgili boyuttur. Her iki alt boyutta beřli Likeert tarzı sorudan oluřan [Hibir zaman (0), neredeyse hi (1), bazen (2), olduka sık (3) veya ok sık (4)] 10’ar madde yer almaktadır. Yapılan literatr taramasında bu arařtırmadan nce PIQ’nn Trk Kltrne uyarlama alıřmasının yapılmadıėı anlařıldı. Bu nedenle arařtırma kapsamından PIQ’nn Trk Kltrne uyarlaması yapılarak geerli ve gvenilir veri elde edemediėine dair kanıtlar da sunulmaya alıřıldı. leėin uyarlama alıřması leėi geliřtiren arařtırmacılar tarafından uyarlama yapmak iin izin alınması ile bařladı. İki akademisyenden oluřan bir ekip (bir aile hekimi ve bir klinik psikolog) orijinal formdaki maddeleri Trke ’ye evirdi. Bir uzman formu oluřturmak iin her bir maddenin nce İngilizce orijinal cmlesi, altına Trkeye evirmiř cmlesi ve altına geri İngilizceye evrilmiř cmlesi verildi. Her bir madde iin formda grř alınacak uzmanlara “Uygun”, “Uygun Deėil” seenekleri ile grř sunmak isteyenler iin “nerileriniz” seeneėi aıldı. Psikoloji, psikiyatri ve aile hekimliėi alanından sigara ile ilgili arařtırmaları olan, İngilizcede yetkinliėi olan 11 arařtırmacıdan uzman grř alındı. Alınan uzman grřleri arasındaki tutarlılık Krippendorff Alpha (2004) ile hesaplandı. Hesaplanan deėer 0,93 olarak belirlendi ve bu deėer yksek tutarlılık gstergesi olarak kabul edildi. Ayrıca uzmanlardan alınan neriler doėrultusunda maddeler son kez gzden geirildi ve uygulama formu elde edildi.

lek Ondokuz Mayıs niversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliėi A.D. Sigara Bırakma Polikliniėine bařvuruda bulunan 611 kiřiye uygulandı (İlk test). Bir ay sonra aynı vaka grubundan 598 kiři ankete tekrar cevap verdi (Yenilenen Test). İlk ve yenilenen testlerden elde edilen veriler SPSS yazılımına aktarıldı. Maddelerde eksik veri olup olmadığı incelendi. Uygulamalar uzman ya da asistan hekim kontrolnde uygulandıėı iin verilerde eksik veri bulunmadı. Her maddeye katılımcıların verdikleri yanıtlara gre verilerin ok deėiřkenli normal daėılımı incelendi. Verilerin ok deėiřkenli normal daėılıma uygun olduėu belirlendi. Elde edilen bu sonuca gre doėrulayıcı faktr analizi (Confirmatory Factor Analysis-CFA) uygulaması yapıldı. PIQ-20-TR daha sonra aynı vakalara bir ay sonra tekrar uygulandı. Her iki anketin (test ve re-test) birbirleri ile korelasyonları karřılařtırıldı.

Katılımcıların ortalama yařı $35,54 \pm 4,7$ yıl, evlilik sreleri $10,02 \pm 2,47$ yıl, FNDT skorları $5,1 \pm 1,87$ puan, paket yılları $13,69 \pm 1,22$ idi. Katılımcılara uygulanan ilk teste katılımcılar olumlu boyuta ortalama $29,96 \pm 1,58$ puan, olumsuz boyuta ise $18,37 \pm 2,54$ puan vermiřlerdir. Yapılan analizlerde Toplam PIQ-20-TR iin Cronbach Alpha deėeri; 0,92, Negatif alt lek 0,85 ve Pozitif lek 0,87 olarak saėlandı. Pozitif ve negatif tekrar test ve test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliřki vardı ($p < ,001$). Doėrulayıcı Faktr Analizleri ve uyum indeksleri, PIQ-20-Tr'nin ($X^2/sd = 2,131$; RMSEA = 0,054; GFI = 0,902; AGFI = 0,933; NFI = 0,963; IFI = 0,971; CFI = 0,97) yksek geerliliėini ortaya koydu. Uygulanan CFA’nın doėrulanıp doėrulanmadığına analizde elde edilen uyum indeksleri (fit indexes) ile karar verilmektedir.

Literatr dikkate alındığında bu arařtırmada hesaplanmış fit indekslerin bazılarının kabul edilebilir bazılarının ise mkemmel uyum deėerlerine karřılık geldiėi belirlendi. Elde edilen veriler doėrultusunda Eř Etkileřim Anketinin (PIQ-20-TR) Trk Kltrndeki uygulamasında geerli ve gvenilir veriler elde edebileceėine karar verildi.