

Geniřletilmiř Özet

Giriř

Nikotin, sigara dumanındaki bağımlılığa neden olan temel maddedir. Sigara kullanımını nikotin bağımlılığın geçmiřten bugüne en yaygın türü olmasıyla beraber beynin hücrel işlev ve yapısında kalıcı deęişikliklerle karakterize, dürtüsel, önüne geçilmesi güç, tekrarlayan sigara kullanımını davranıřı biçiminde kendini gösteren dolayısıyla kronik hal alabilen bir bağımlılık çeřidi řeklinde ifade edilmektedir. Sigara bağımlılığında pek çok ruhsal faktör etkilidir. Bu çalıřma sigara bağımlısı üniversite öğrencilerinde psikolojik esneklik ve dürtüsellik düzeylerinin nikotin bağımlılık düzeyleriyle iliřkisini arařtırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem

Arařtırma evrenini arařtırmaya katılmaya onam veren Hamidiye Saęlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğrenim gören DSM-5 tanı kriterlerine tütün bağımlısı olan ve sigara kullanan 252 ve sigara kullanmayan 294 olmak üzere toplam 546 lisans öğrencisi oluřturmaktadır. Sigara kullanmayan öğrencilere Psikolojik Esneklik Ölçeęi (PEÖ) ve BarratDürtüsellik Ölçeęi (BDÖ), sigara kullanan öğrencilere ise ek olarak Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi (FNBT) uygulanmıřtır. Verilerin analizi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21 paket programı kullanılmıřtır.

Bulgular

Sosyodemografik veriler incelendiğinde sigara kullanan grupta (çalıřma grubu) erkek cinsiyet oranı, alkol kullanımı, madde kullanımı, anne-baba-arkadař sigara içimi, disiplin cezası alma, not ortalaması düřüklüğü anlamlı olarak yüksek bulunmuřtur (hepsi için $p<0.001$). Nikotin bağımlılığı olan öğrenciler bağımlılığı olmayan grupla kıyaslandığında PEÖ deęerler; anda olma, kabul, bağlamsal benlik, ayrıřma alt ölçekleri puanları ve PEÖ toplam puanı anlamlı derecede düşük bulunurken (hepsi için $p<0.001$), BDÖ dikkat dürtüselligi, motor dürtüsellik, plan yapmama alt ölçekleri puanları ve BDÖ toplam puanı anlamlı derecede yüksektir (hepsi için $p<0.001$). Ayrıca sigara içen grupta katılımcıların FNBT puanları ile BDÖ alt ölçek ve toplam puanları arasında pozitif düzeyde anlamlı bir iliřki bulunmuřtur (hepsi için $p<0.001$).

Sınırlılıklar ve Gelecekteki Arařtırmalar için Öneriler

Bu çalıřmanın bazı sınırlılıkları vardır. Birincisi, arařtırma örneklemi sadece üniversite öğrencilerinden oluřmuřtur ve bu nedenle daha heterojen kültürel ve sosyoekonomik örneklere genelleme yapılamaz. Yüksek riskli ve belirti řiddeti gösteren öz bildirimli ölçekler kullanıldığı için bu durum bulguların genelleřtirilmesi sınırlandırmaktadır. Çalıřmanın sonuçları yapılandırılmıř görüřmelerle desteklenecek klinik çalıřmalar ve bu alanda uygulanacak rehabilitasyon çalıřmaları için yarar saęlayabilir.

Sonuç

Psikolojik esneklik ve dürtüsellik sigara bağımlılığında rol oynayan iki önemli etmendir. Ergenlerin tütün kullanımını bırakma konusunda yařadıkları zorluklar göz önüne alındığında, tütün kullanımına bařlamanın önlenmesi ihtiyaç fazladır. Bağımlılığın gelişiminde veya devam etmesinde söz sahibi olan faktörlerin incelenmesi bağımlılıkla mücadele ve bu alanda yapılandırılacak rehabilitasyon çalıřmaları açısından kritik öneme sahiptir.